



제품정보

제 품 명 : 스트레치마크 케어 젤(Stretchmark Care gel)

비급여코드 : BM5001GO

사용 목적 : 오래되거나 새로 생긴 피부 흉터 및 튼살에 보호막을 형성하여 튼살을 예방하거나 관리하는 목적으로 사용

작용 원리 : 튼살때문에 가렵거나 불편함을 느낄 때 도움을 주고 변색을 완화하여 피부증상 개선

대상 환자 : 임신부(13주 이상) 및 출산부, 성장기 청소년, 비만, 급격한 근육 증가 튼살, 내분비 및 소모성 만성질환 튼살, Cushing 증후군 튼살, 장기 스테로이드 부작용 튼살

사용 방법 : 최소 약 60~90일, 하루 1회 이상 드레싱 후 얇게 도포하여 3~4분 건조

포장 단위 : 15g x 1EA / BOX, 30g x 1EA / BOX

사용 기간 : 제조일로부터 36개월, 개봉 후 12개월

Reference

[1] 식약처 의료기기 제품정보 : <http://emed.mfds.go.kr>

[2] Chan KY, Lau CL, Adeeb SM, et al. A randomized, placebo-controlled, double-blind, prospective clinical trial of silicone gel in prevention of hypertrophic scar development in median sternotomy wound. *Plast Reconstr Surg.* 2005;116(4)

이 제품은 '의료기기'이며 '사용상의 주의사항'과 '사용방법'을 잘 읽고 사용하십시오.



판매원 : (주)이노트
경기도 안양시 만안구 안양로 336 금강빌딩 3층
T 031-446-0099



Stretchmark Care

Polydimethylsiloxanes polymer


Stretchmark Care

I 튼살 + 가려움증 + 흉터 개선

튼살로 인해 가려움증과 불편함을 느낄 때 튼살 및 흉터 완화에 도움을 주는 점착성투명창상피복재입니다.

I Polydimethylsiloxane Polymer

튼살 및 흉터 부위에 도포 후 건조되면 Polydimethylsiloxane(CPX) 성분이 얇은 보호막을 형성하여 수분 손실을 막아주고, 콜라겐 생성을 정상화하여 흉터와 튼살을 관리해주는 의료가기입니다.¹⁻²



Trymethyl Siloxane 일반 Siloxane 보다 수분 보충과 코팅력 우수

Mirasil cetyl DM 균일한 퍼짐성과 부드러운 발림성 형성

Dimethiconol 손상된 피부를 유연하고 촉촉하게 유지

Vitamin C 성분 콜라겐과 탄력 손실의 속도 낮춤, 피부 탄력 유지, 색소 침착 방지, 항산화 작용으로 주름 예방




미국 FDA, GMP 적합인증 I

순수 국내 기술로 개발된 Stretchmark Care gel은 미국 FDA와 국내 GMP 적합인증을 받았습니다.

I 무독성, 무자극

식품의약품안전처 고시 제 2018-93호, 제 2020-12호, ISO 10993-10의 GLP기준 및 시험 지침에 따른 임상시험 결과 무독성, 무자극, 감작성 비유발 물질로 평가되었습니다.

* KCL 시험번호 : GM21-00419, GM21-00420, GM21-00421



망상진피층
얇고 무작위로 배열된 콜라겐과 엘라스틴 섬유(유두진피)
두꺼운 콜라겐 다발 우세(망상진피)

피부 부종
콜라겐의 구조적 변화를 보여주는 피부 탄력 섬유의 우세
미세혈관 증가 붉은색을 띠

망막 상실을 동반한 표피위축증
진피-표피 접합부에 평행하게 정렬, 밀집된 콜라겐 섬유
미세혈관 감소로 인해 색이 엷어짐



Stretchmark Care